

ETUDE	FORME EB	PRINCIPE	PUBLIC	SUIVI	CRITERES D'INCLUSION	DUREE	CENTRES IMPLIQUES
diacéréine 1%	simple	crème à appliquer	adultes	Plusieurs visites sur site d'environ une demi-journée	Atteinte > 2% de la surface du corps, pieds exclus	8 semaines	Necker St Louis Nice
EASE oleogel (bétuline)	Pas d'EB simple	crème à appliquer au minimum tous les 4 jours	à partir de 21 jours	Plusieurs visites sur site d'environ une demi-journée	Avoir une plaie chronique de 10 à 50cm ² max depuis au moins 3 semaines	2 ans	Necker St Louis Nice Toulouse
WYNGS ARNm exon 73 col7a1	dystrophique récessive	crème à appliquer	dés 2 ans	Plusieurs visites sur site mais surtout 2 biopsie cutanée (une avant traitement et une apres)	a. une mutation de l'exon 73 de col7a1 b. Avoir une plaie active en cours de cicatrisation d'au moins 10cm ²		Necker St Louis Nice
toxine botulique	simple localisée	Injection sous anesthésie locale de botox dans la plante des pieds	adultes	4 visites sur site	- Lésions cutanées plantaires à type de zones érythémateuses œdémateuses et/ou bulles et/ou érosions et/ou croûtes (3 lésions ou plus par pied) - Atteinte similaire au niveau des 2 pieds en terme de sévérité	9 mois	Necker St Louis Nice Toulouse